

急な咽頭痛

粘膜発赤・扁桃白苔付着

急性咽頭炎
急性扁桃炎

頸部リンパ節腫脹あり

唾液接触あり

肝酵素上昇

伝染性単核球症

咽頭所見なし

GERD
異物
虚血性心疾患
など

頸部腫脹

咽頭側壁・後壁腫脹

造影CT

膿瘍腔あり

扁桃周囲膿瘍
咽後膿瘍
頸部膿瘍

嚔声

呼吸苦、SPO2低下あり

上気道狭窄の可能性高い

頸部Xp

所見なし

急性喉頭炎

喉頭蓋腫脹あり

急性喉頭蓋炎

鼻出血

鼻出血は仰向けにしない

活動出血なし

活動性出血あり

バイタル正常

バイタル異常

キーゼルバッハに
出血点あり

出血点不明

キーゼルバッハに
出血点あり

出血点不明

バイタル管理
咽頭への垂れ込みが
多ければ気管挿管考慮

経過観察
出血すれば圧迫止血指示

経過観察
出血あれば耳鼻科ある病院受診
*日中ならコンサルトしてもOK

咽頭への
垂れ込み少ない

咽頭への
垂れ込み多い

尿道カテーテル
ベロックタンポン

ガーゼや
メローセル挿入

尿道カテーテル
ベロックタンポン
ガーゼ挿入も可

止血できれば翌日耳鼻科へ
できれば挿入物の情報のため紹介状作成

当日に近くの耳鼻科が
ある病院に紹介

救急搬送

*経過観察は翌日の耳鼻科受診を説明

急性発症のめまい

低血糖・電解質異常チェック

神経学的異常なし

神経学的異常あり

注視眼振なし

注視眼振あり

一定方向の水平眼振

中枢性を示唆する眼振

問診で前失神
または
心原性を示唆する
随伴症状あり

問診がBPPV
かつ
頭位眼振で
方向交代性水平性眼振あり

耳症状あり

耳症状なし

メニエール病
突発性難聴

前庭神経炎

心電図などで精査

CT・MRI

*帰宅する前にもう一度起立・歩行障害の有無をチェック
*症状強ければ入院での経過観察を考慮